ATTI ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE SCIENZE FISICHE MATEMATICHE NATURALI

RENDICONTI

PAOLA VITA FINZI, CARLO SCOTTI

Sintesi eterocicliche con etossiacetilene. - Nota IV. Azidi alifatiche ed etossiacetile

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti, Serie 8, Vol. 41 (1966), n.3-4, p. 204-209.

Accademia Nazionale dei Lincei

<http://www.bdim.eu/item?id=RLINA_1966_8_41_3-4_204_0>

L'utilizzo e la stampa di questo documento digitale è consentito liberamente per motivi di ricerca e studio. Non è consentito l'utilizzo dello stesso per motivi commerciali. Tutte le copie di questo documento devono riportare questo avvertimento.

*Articolo digitalizzato nel quadro del programma
bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica)
SIMAI & UMI*

<http://www.bdim.eu/>

Non è stata finora stabilita la posizione del gruppo etossilico, ma per analogia con le reazioni dell'etossiacetilene con le arilazidi e le solfonazidi sembra plausibile ritenere che il gruppo $-\text{OC}_2\text{H}_5$ si trovi nella posizione 5.

Dalla reazione con azidoetanolo abbiamo ottenuto una miscela liquida di prodotti difficilmente separabili, che allo spettro IR presenta una piccola banda ossidrilica a 3350 cm^{-1} , una forte banda carbonilica da estere a 1730 cm^{-1} e una banda a 1227 cm^{-1} attribuibile a un gruppo acetato. È noto che l'etossiacetilene può servire da acetilante [4] e in questo caso, oltre che a dare la reazione di condensazione con il gruppo azidico, reagisce evidentemente con il gruppo alcoolico formando il corrispondente acetato. La miscela è quindi formata dal 2-(etossi-1,2,3-triazolil-1-)etanolo (I a) e dal suo acetato (I b), quest'ultimo in maggiore quantità. Il prodotto (I b) è stato ottenuto per sintesi diretta da etossiacetilene e acetato dell'azidoetanolo.

Per idrolisi acida tanto della miscela che del prodotto (I b) abbiamo isolato l'etossitriazoliletanolo (I a) puro che, trattato successivamente con cloruro di tionile, ci ha fornito l'1-(2-cloroetil)etossitriazolo (I c), identico a quello ottenuto per reazione dell'etossiacetilene con il 2-cloro-1-azidoetano.

Per trattamento con KOH alcoolica del prodotto (I c) abbiamo isolato un composto liquido che non è stato analizzato, ma è stato riconosciuto come 1-vinil-etossi-1,2,3-triazolo (I d) dallo spettro IR, che presenta una forte banda da doppio legame a 1665 cm^{-1} e bande viniliche a 965 e 900 cm^{-1} . La sua struttura è inoltre confermata dalla reazione con il benzonitrilossido a 1-(3'-fenil-5'- Δ^2 -isossazolinil) etossitriazolo (I e). Per trattamento dell'1-viniletossitriazolo con permanganato di potassio in soluzione acetonica abbiamo ottenuto l'etossitriazolo (I l). Quest'ultimo composto è stato riconosciuto dalle sue proprietà acide, dall'analisi e dallo spettro IR, che presenta una forte banda a 3215 cm^{-1} attribuibile a un gruppo $-\text{NH}$.

Per condensazione dell'azidoacetato di etile con etossiacetilene abbiamo ottenuto l'etossitriazolilacetato di etile (I f). La sua struttura è stata dimostrata oltre che dall'analisi e dallo spettro IR, dalla riduzione con idruro di litio e alluminio al corrispondente alcool (I a). Per idrolisi di (I f) abbiamo ottenuto l'acido etossi-triazolilacetico (I h), che per trattamento con diazometano ci ha fornito l'etossitriazolilacetato di metile (I g).

L'1-acetonil-etossi-1,2,3-triazolo (I i), ottenuto per condensazione dell'etossiacetilene con azidoacetone, per trattamento con KOH alcoolica a caldo ci ha fornito l'etossitriazolo (I l). Evidentemente in ambiente basico non si ha idrolisi del gruppo etossilico come nel caso degli 1-aril-5-etossi-1,2,3-triazoli ma distacco della catena laterale legata all'atomo di azoto. Per vedere se la reazione di scissione della catena laterale in ambiente basico ha carattere generale e dato che gli altri composti triazolici da noi preparati danno in ambiente basico altre reazioni (eliminazione o idrolisi), abbiamo fatto reagire l'azidoacetone con il fenilacetilene. La reazione avviene rapidamente a caldo e lentamente a freddo fornendo due composti isomeri. Abbiamo attribuito la struttura di 1-acetonil-4-fenil-1,2,3-triazolo al più altofondente (p. f. $143-144^\circ$) e di 1-acetonil-5-fenil-1,2,3-triazolo al più bassofondente (p. f. $91-92^\circ$).

per analogia con altri casi noti in letteratura. Ambedue gli isomeri hanno fornito, per trattamento con KOH alcoolica a caldo, il 4-feniltriazolo. La reazione di scissione del gruppo acetilico legato all'azoto è quindi probabilmente generale e avviene tanto sui triazoli sostituiti in 4 che in 5:

I tentativi di idrolisi del gruppo etossilico in ambiente acido hanno portato alla formazione di sali e non abbiamo in nessun caso ottenuto il relativo ossitriazolo.

PARTE SPERIMENTALE [5].

Reazione tra etossiacetilene e azidi: metodo generale: moli 0,1 di azide e moli 0,13 di etossiacetilene [6] in 10 cm³ di benzene anidro vengono scaldati per 25-35 ore su bagno maria e poi per 8-10 ore su bagno a olio a 110-120°. La soluzione diventa presto scura. Si allontanano il benzene e l'azide non reagita (circa il 25-30%) o per distillazione in corrente di vapore o distillando sotto vuoto (circa 1 mm) e raccogliendoli in una trappola raffreddata con miscela frigorifera. Il residuo viene distillato sotto vuoto e il prodotto purificato per ulteriore distillazione sotto vuoto o per cristallizzazione.

Le rese e i dati relativi ai prodotti preparati sono riportati nella Tabella I.

2-[I-(etossi-1,2,3-triazolil)] etanolo (Ia): ottenuto (a) per idrolisi con KOH metilalcolica al 10%, a temperatura ambiente per due giorni, tanto dalla miscela di reazione tra azidoetano [7] ed etossiacetilene quanto da (I b) e successiva estrazione con etere in continuo; (b) per riduzione con LiAlH₄ di (I f).

I(2-acetossietil)-etossi-1,2,3-triazolo (I b): ottenuto dalla reazione tra etossiacetilene e 2-acetossi-1-azidoetano [7]. Il prodotto si decompone facilmente e non è stato possibile isolarlo allo stato puro neppure dopo ripetute distillazioni frazionate.

I(2-cloroetil)-etossi-1,2,3-triazolo (I c): ottenuto (a) per condensazione dell'etossiacetilene con il 2-cloro-1-azidoetano [8] e (b) per trattamento con cloruro di tionile del 2-(etossitriazolil)etanolo (I a). Aghi lucenti. Solubile in benzene e alcool, insolubile in etere di petrolio e *n*-esano.

TABELLA I.
I-Alchil-5 (o 4)-etossi-1,2,3-triazoli (I).

I	R =	Tempo totale in ore	p.f. °C	p.eb. °C (mmHg)	Resa. %	trov. %			calc. %			All'analisi per
						C	H	N	C	H	N	
a	CH ₂ -CH ₂ OH	=	34-36	140-145 (0,3)	a) 40 b) 50	45,71	7,39	26,25	45,85	7,05	26,74	C ₆ H ₁₁ N ₃ O ₂
b	CH ₂ -CH ₂ -OCOCH ₃	40	=	114-115 (0,03)	40	=	=	21,89	=	=	21,10	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₃
c	CH ₂ -CH ₂ Cl	44	42,5-43	140-142 (2,5)	a) 47	41,33	5,79	23,45(*)	41,04	5,74	23,93	C ₆ H ₁₀ ClN ₃ O
d	CH=CH ₂	=	=	70 (12)	82	=	=	=	=	=	=	=
e	C ₆ H ₅ -	=	151-152	=	55	60,12	5,48	21,84	60,45	5,46	21,70	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O ₂
f	CH ₂ -COOC ₂ H ₅	40	46	140-145 (0,3)	60	47,91	6,32	21,48	48,23	6,58	21,10	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₃
g	CH ₂ -COOCH ₃	=	65	=	=	45,29	6,17	22,64	45,40	5,99	22,69	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₃
h	CH ₂ -COOH	=	144	=	91	42,37	5,32	24,69	42,10	5,30	24,55	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃
i	CH ₂ -CO-CH ₃	52	78	140-145 (0,2-0,3)	50	50,09	6,70	24,90	49,69	6,55	24,84	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₂
l	H	=	75	subl. 50-70 (0,5)	a) 15 b) 65	42,34	6,72	37,12	42,47	6,24	37,15	C ₄ H ₇ N ₃ O

(*) Cl : trov. % : 20,10; calc. 20,19.

I-Vinil-etossi-1,2,3-triazolo (I d): olio incolore, ottenuto per trattamento di (I c) con KOH metilalcoolica a ricadere per 8 ore.

I(3'-Fenil-5'- Δ^2 -isossazolil)-etossi-1,2,3-triazolo (I e): ottenuto per ebollizione a ricadere su bagno maria di una soluzione equimolecolare di (I d) e benzonitrilossido, ottenuto nel solito modo dalla benzalclorossima [9]. Il prodotto è poco solubile in etere e cristallizza da benzene o etanolo.

I-Carbetossimetil-etossi-1,2,3-triazolo (I f): dalla condensazione dell'etosiacetilene con l'azidoacetato di etile [10]. Cristallizza da etere isopropilico.

I-Carbometossimetil-etossi-1,2,3-triazolo (I g): ottenuto da (I h) per trattamento con una soluzione eterea di diazometano. Cristallizza da etere isopropilico.

Acido etossi-1,2,3-triazolilacetico (I h): da (I f) per trattamento a ricadere per 4 ore con KOH metilalcoolica al 20%; precipita il sale di potassio che viene filtrato e trattato con acidi. Dalla soluzione acida estratta con etere in continuo per 24 ore si ottiene l'acido, che è solubile in acqua, alcool, acido acetico, acetato di etile e diossano, insolubile in benzene, esano e CCl_4 e cristallizza da una miscela di diossano ed etere isopropilico.

I-Acetonil-etossi-1,2,3-triazolo (I i): per condensazione dell'azidoacetone [10] con etosiacetilene. Il prodotto cristallizza in scaglette incolori lucenti da benzene-etero di petrolio o da etere isopropilico.

Il *p. nitrofenilidrazone* si presenta in aghetti gialli soffici p.f. 173-173,5° (da etanolo). All'analisi:

	trov. % :	N 27,82
per $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{N}_6\text{O}_3$	calc. :	27,62.

Il *semicarbazone* ha p. f. 192-193° (da etanolo). All'analisi:

	trov. % :	N 36,99
per $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{N}_6\text{O}_2$	calc. :	37,15.

Etossi-1,2,3-triazolo (I l): ottenuto (a) per trattamento di (I d) in soluzione acetonica con KMnO_4 e (b) per azione della potassa metilalcoolica su (I i) per 90 ore. Si estrae dalla soluzione acidificata e si cristallizza da cicloesano.

I-Acetonil-4-fenil-1,2,3-triazolo e *I-acetonil-5-fenil-1,2,3-triazolo*: quantità equimolecolari di azidoacetone e di fenilacetilene sciolte in pochi cm^3 di benzene vengono bolliti a ricadere per 24-30 ore. Per evaporazione del solvente si separa un prodotto p.f. 139-140°, mentre le acque madri filtrate vengono distillate in corrente di vapore per separare il fenilacetilene e l'azide non reagita (circa il 25% della quantità messa a reagire). Dal residuo della distillazione in c.v. precipita ancora del prodotto p.f. 140-142°, che cristallizza da metanolo in aghetti incolori e fonde a 143-144° (resa totale 28%). All'analisi:

	trov. % :	C 65,61 ;	H 5,58 ;	N 21,05 ;
per $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{N}_3\text{O}$	calc. :	65,67 ;	5,51 ;	20,88 .

Per estrazione con etere delle acque madri della distillazione in c.v. si ottiene un prodotto che, ricristallizzato da benzene-cicloesano, fonde a 91–92° (resa 25%). All'analisi:

	trov. % :	C 65,93 ;	H 5,47 ;	N 20,97 ;
per $C_{11}H_{11}N_3O$	calc. :	65,67 ;	5,51 ;	20,88 .

Trattamento con KOH metilalcolica degli 1-acetonil-feniltriazoli a ricadere per 2 giorni: per estrazione delle acque madri basiche si riottiene poco prodotto non reagito; dopo acidificazione, per estrazione eterea si ottiene un prodotto p.f. 142–143° che deprime il punto di fusione con il prodotto di partenza ma non quello in miscela con un campione autentico di 4-fenil-1, 2, 3-triazolo del quale ha anche identico spettro IR.

BIBLIOGRAFIA.

- [1] P. GRÜNANGER, P. VITA FINZI e E. FABBRI, « Gazz. chim. it. », 90, 413 (1960).
- [2] P. GRÜNANGER e P. VITA FINZI, « Tetr. Letters », 1963, 1839; P. GRÜNANGER, P. VITA FINZI e C. SCOTTI, « Ber. », 98, 623 (1965).
- [3] J. A. DURDEN Jr., H. A. STANSBURY e W. H. CATLETTE, « J. Chem. Eng. Data », 9, 228 (1964).
- [4] H. C. VOLGER e J. F. ARENS, « Rec. trav. chim. », 77, 1170 (1958).
- [5] I p.f. non sono corretti. Gli spettri IR sono stati registrati su uno spettrofotometro Perkin-Elmer mod. Infracord 137. Le analisi sono state eseguite dalla dott. Lucia Maggi Dacrema che qui ringraziamo.
- [6] J. F. ARENS, « Rec. trav. chim. », 74, 271 (1955).
- [7] M. O. FOSTER e H. E. FIERZ, « J. chem. soc. », 93, 1865 (1908).
- [8] G. R. CLEMO e W. H. PERKIN, « J. Chem. soc. », 121, 644 (1922); R. H. WILEY e J. MOFFAT, « J. org. chem. », 22, 995 (1957).
- [9] A. QUILICO, G. STAGNO D'ALCONTRES e P. GRÜNANGER, « Gazz. chim. it. », 80, 487 (1950).
- [10] M. O. FORSTER e H. E. FIERZ, « J. chem. soc. », 93, 72 (1908).