ATTI ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE SCIENZE FISICHE MATEMATICHE NATURALI

RENDICONTI

MARIE-LOUISE DUBREIL-JACOTIN

Quelques propriétés des O-Demi-Groupes

*Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche,
Matematiche e Naturali. Rendiconti, Serie 8, Vol. 41 (1966), n.5, p. 279–289.*
Accademia Nazionale dei Lincei

<http://www.bdim.eu/item?id=RLINA_1966_8_41_5_279_0>

L'utilizzo e la stampa di questo documento digitale è consentito liberamente per motivi di ricerca e studio. Non è consentito l'utilizzo dello stesso per motivi commerciali. Tutte le copie di questo documento devono riportare questo avvertimento.

*Articolo digitalizzato nel quadro del programma
bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica)
SIMAI & UMI*

<http://www.bdim.eu/>

Matematica. — *Quelques propriétés des O-Demi-Groupes.* Nota di MARIE-LOUISE DUBREIL-JACOTIN, presentata (*) dal Socio B. SEGRE.

RIASSUNTO. — Per un semigruppò, D , il fatto ch'esso possa venire ordinato totalmente implica certe proprietà di struttura, legate alla considerazione dell'equivalenza in fusi (secondo S. Schwartz), ravvicinanti D a dei semigruppò abeliani.

Suivant la terminologie classique dans les groupes ordonnés [1] nous appellerons O -demi-groupe un demi-groupe pouvant être totalement ordonné; O^* -demi-groupe un demi-groupe tel que toute relation d'ordre de ce demi-groupe admette une extension maximale qui soit un ordre total.

Nous allons donner quelques propriétés de structure des O -demi-groupe liées à la considération de l'équivalence en fuseaux.

1. Nous allons d'abord faire quelques remarques préliminaires.

1) Il est d'usage dans un demi-groupe D de considérer dans l'ensemble E des idempotents la relation d'ordre

$$e < f \iff ef = fe = e \text{ (ou la relation opposée } e < f \iff ef = fe = f)$$

appelée par Clifford « ordre partiel naturel » [2].

Appelons comme Clifford « bande » un demi-groupe idempotent. On sait [2] qu'une bande commutative est pour l'ordre partiel naturel un demi-treillis. Nous remarquerons de plus que:

PROPOSITION 1. — *L'ordre partiel naturel est un ordre maximal pour le demi-groupe constitué par une bande commutative. Une bande commutative n'est donc pas un O^* demi-groupe en général.*

D'abord la relation d'ordre est bien dans ce cas isotone puisque $ef = fe = e$ entraîne $efg^2 = feg^2 = eg^2$, qui s'écrit, puisque $eg^2 = eg$, $efg^2 = (eg)(fg)$, $(eg)(fg) = (fg)(eg) = eg$.

Pour voir que cet ordre est maximal, il nous suffit de considérer deux éléments e et f non comparables c'est-à-dire tels que $ef = fe$ est $\neq e$ et $\neq f$. (Si on avait $ef = fe = e$ ou f pour tout e et f , la bande commutative serait — par ce procédé — totalement ordonnée). Alors l'introduction de $e < f$ par exemple entraîne que $e \leq ef \leq f$ par l'isotonie, c'est-à-dire que e et f engendrent le demi-groupe constitué par la chaîne stricte $e < ef < f$ qui ne peut appartenir à un ordre extension de l'ordre naturel pour lequel e et f sont tous deux plus petits (ou plus grands) que ef .

(*) Nella seduta del 12 novembre 1966.

2) On sait qu'étant donné un demi-groupe D , on peut toujours, s'il n'a pas d'élément neutre u , lui en adjoindre un et considérer le demi-groupe $D^* = D \cup \{u\}$.

PROPOSITION 2. - Si D est un O-demi-groupe, $D^* = D \cup \{u\}$ n'en est pas un en général.

Il suffit pour s'en assurer de donner un exemple. Considérons la bande (B) donnée par sa table:

	e	a	b	f
e	e	a	b	b
a	a	a	b	b
b	a	a	b	b
f	a	a	b	f

qui est un O-demi-groupe puisqu'elle admet l'ordre:

$$e < a < b < f.$$

Adjoignons à B l'élément neutre u et essayons d'ordonner totalement $B^* = B \cup \{u\}$. Si on posait $u < a$ l'isotonie entraînerait:

$$ue = e < a = ea \quad \text{et} \quad uf = f \leq a = fa.$$

Mais $e < a$ et $f < a$ avec $fe = a$ est incompatible avec e comparable à f qui exige que fe soit compris entre f et e . Comme $a < u$ entraîne de même $a < f$ et $a < e$ on ne peut définir aucun ordre total sur B^* .

Cette propriété est liée à la considération des éléments positifs et négatifs d'un demi-groupe ordonné. Cette notion fondamentale dans le cas d'un groupe ordonné (puisque l'ordre d'un groupe est donné par son cône positif) n'a pas d'analogue satisfaisant dans le cas d'un demi-groupe.

Considérons d'abord le cas simple d'un demi-groupe unitaire D^* c'est-à-dire possédant un élément neutre u . Nous appellerons alors *positif* (ou strictement positif) un élément a vérifiant

$$(1) \quad a \geq u \quad (\text{ou } a > u).$$

L'isotonie entraîne alors dans les deux cas

$$(2) \quad x \leq ax \quad \text{et} \quad x \leq xa \quad \text{quel que soit } x \in D^*$$

et en particulier

$$(3) \quad a \leq a^2.$$

Naturellement, on définit de la manière duale un élément négatif. u est le seul élément à la fois positif et négatif. Rappelons [1] que si le demi-groupe D n'est pas unitaire, on appelle *positif* tout élément a vérifiant (2), c'est-à-dire à la fois positif à gauche ($ax \geq x \quad \forall x \in D$) et positif à droite ($xa \geq x, \quad \forall x \in D$). Alors tout élément plus grand qu'un élément positif est positif et si P_g, P_d, P désignent l'ensemble des éléments positifs à gauche, à droite ou positifs, on a $P^2 \subseteq P$. On définit de la manière duale les éléments négatifs

à gauche à droite et négatifs et si N est l'ensemble de ces derniers $N^2 \subseteq N$. Remarquons alors que si D est totalement ordonné, mais n'est pas unitaire, on n'a pas en général $D = P \cup N$, comme le montre par exemple le demi-groupe (B) ci-dessus.

On a $P_g = P_d = P = \{f\}$, $N_g = N_d = N = \{e\}$ et $D = P \cup N = \{a, b\}$. Par suite au théorème ([1], p. 158): «Un demi-groupe ordonné D sans élément neutre peut être immergé dans un demi-groupe ordonné minimal $D^* = D \cup \{u\}$ ayant un élément neutre u , avec préservation de l'ordre et de la propriété pour un élément d'être positif ou négatif si et seulement si dans $D : P_g = P_d$, $N_g = N_d$, on peut donner l'additif suivant:

PROPOSITION 3. - Si D est totalement ordonné, D^* est totalement ordonné si et seulement si $D = N \cup P$.

Dans la plupart des travaux antérieurs au livre de L. Fuchs [1] (et pour la bibliographie correspondante, nous renvoyons à ce livre) on suppose le demi-groupe *positivement ordonné*; c'est-à-dire $D = P$.

On suppose souvent aussi la condition supplémentaire

$$(\alpha) \quad a < b \iff \exists x \text{ et } y \in D, \quad ax = b, ya = b.$$

Un demi-groupe positivement ordonné et vérifiant la condition (α) est dit: *ordonné d'une manière naturelle*.

Depuis, T. Saito a entrepris l'étude des demi-groupes totalement ordonnés sans rien supposer de restrictif sur l'ordre - en dehors, naturellement, de l'isotonie - dans une série de mémoires ou comme approche du problème général il étudie d'abord le cas d'une bande, [3] puis de certains demi-groupes particuliers [4] [5] [6]. Avec Saito, nous appellerons *f-positif* tout élément vérifiant (3) et aussi *f-négatif* tout élément b tel que $b^2 \leq b$. Rappelons les résultats simples mis en évidence par Saito. Le produit de deux éléments *f-positifs* (*f-négatifs*) est *f-positif* (*f-négatif*); tout élément d'un demi-groupe totalement ordonné est ici *f-positif* ou *f-négatif* - mais un élément *f-négatif* peut être plus grand qu'un élément *f-positif* et alors leurs deux produits sont des idempotentes compris entre les deux.

H. Lugowski [7] a d'ailleurs montré que si D est muni d'un ordre total vérifiant (α) un élément *f-négatif* est négatif.

3) En vue d'obtenir des résultats simples concernant les idempotents d'un demi-groupe unitaire, considérons dans un demi-groupe D deux idempotents e et f et les conséquences qu'entraîne la possibilité de définir dans D une relation d'ordre dans laquelle on aurait $e < f$.

L'isotonie entraîne immédiatement:

$$\left\{ \begin{array}{l} e \leq ef \leq fef \leq f \\ e \leq fe \leq fef \leq f \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} e \leq efe \leq ef \leq f \\ e \leq efe \leq fe \leq f \end{array} \right.$$

d'où résulte $(ef)^2 = ef$, $(fe)^2 = fe$ et:

PROPOSITION 4. - Deux idempotents e et f d'un demi-groupe D ne peuvent être comparables dans une relation d'ordre de D que si leurs produits sont deux

idempotents; ils engendrent un sous-demi-groupe de D de 6 idempotents ordonné en treillis distributif suivant le diagramme:

De cette proposition résulte le *résultat de Saito*, dans un demi-groupe totalement ordonné les idempotents forment une bande.

Etudions les différentes bandes possibles engendrées par e et f quand on suppose que (A) est totalement ordonné.

La condition $fe < ef$ entraîne immédiatement $fe \leq efe$ d'où $efe = fe$ et de même $ef = fef$, et on obtient la bande (B), qui peut dégénérer en $e = fe < ef < f$ ou $e < fe < f = ef$ qui peuvent encore dégénérer en:

(C₁) $e < f = fe = ef$, (C₂) $e = fe = ef < f$ et (D) $e = fe < f = ef$.

La condition $ef < fe$ entraîne de même $ef \leq fef$ d'où

$$ef = efe \quad \text{et de même} \quad fe = fef$$

et la bande (B') $e < ef = efe < fe = fef < f$ qui peut aussi dégénérer en $e = ef < fe < f$ ou $e < ef < fe = f$ bandes qui peuvent encore dégénérer en (C₁), (C₂) et (D') $e = ef < f = fe$.

Enfin si on suppose (A) commutatif, $ef = fe$, on a la bande, dégénérescence de B et B':

(C) $e < ef = fe < f$.

qui peut dégénérer en (C₁) ou (C₂).

Le raisonnement fait pour la bande (B) montre que dès que ef (ou fe) est distinct de e et de f on ne peut adjoindre un élément neutre u puisque $u < ef (> ef)$ entraîne: e et f inférieurs à ef (supérieurs) en contradiction avec le fait que ef est entre e et f . D'autre part, aucune de ces bandes n'est unitaire (sauf peut-être C₁ et C₂) et nous avons donc comme bandes unitaires totalement ordonnées minimales:

(C₁) $\cup \{u\} : u \leq e < f = ef = fe$; (C₂) $\cup \{u\} : e = fe = ef < f \leq u$;

(D) $\cup \{u\} : e = fe < u < f = ef$; (D') $\cup \{u\} : e = ef < u < f = fe$.

Nous avons donc:

PROPOSITION 5. - La bande des idempotents d'un O-demi-groupe vérifie $ef = fe$ (ou ef), $fef = ef$ (ou fe) quels que soient e et f si le O-demi-groupe est unitaire le produit de deux idempotents quelconques est égal à l'un d'eux.

D'autre part, parmi les bandes possibles engendrées par e et f , seule $e < f = ef = fe$ est une bande positivement ordonnée; et de même, seule $e = fe = ef < f$ est une bande négativement ordonnée. Il en résulte:

THÉORÈME 1. - *La bande D^* des idempotents d'un O-demi-groupe unitaire admet une partition en $\{u\}$ et deux bandes A et B telles que:*

$aa' = a'a = a$ ou a' ; $bb' = b'b = b$ ou b' ; $ab = b$ (ou a), $ba = a$ (ou b)
quels que soient les éléments a, a' de A, b, b' de B.

On peut réciproquement ordonner totalement une telle bande en posant:
 $a < u < b$; $\forall a \in A, b \in B$; $a < a' \Leftrightarrow a = aa' = a'a$; $b < b' \Leftrightarrow b' = bb' = b'b$

2. Nous allons maintenant utiliser l'équivalence en fuseaux pour obtenir certaines propriétés de structure des O-demi-groupes qui les rapprochent des demi-groupes abéliens.

Les propriétés des demi-groupes abéliens totalement ordonnés liées à cette équivalence ont été données par Nakada [8].

L'extension aux demi-groupes nom abéliens réussit grâce au lemme suivant que nous utiliserons fréquemment.

LEMME: *Si, dans un demi-groupe D, ordonné, ab et ba sont comparables, $ab \leq ba$ (par exemple) entraîne que pour tout entier positif N:*

$$a^N b^N \leq (ab)^N \leq (ba)^N \leq b^N a^N.$$

La démonstration, immédiate, de cette propriété ne fait intervenir que l'isotonie et n'est pas autre chose que celle donnée dans [1] (p. 162) pour les éléments positifs d'un demi-groupe totalement ordonné.

Rappelons que:

L'équivalence en fuseaux est définie dans tout demi-groupe D par: $a \equiv b$ (F) si il existe des entiers positifs m et n tels que $a^m = b^n$.

Cette équivalence n'est pas en général compatible avec l'opération du demi-groupe. Les fuseaux ne sont pas en général des parties stables (c'est-à-dire des sous-demi-groupes de D); il en est cependant ainsi si D est commutatif.

Evidemment un fuseau contient au plus un idempotent; les fuseaux sont donc de deux sortes:

1° Ceux $\Phi_\nu, \nu \in I$, qui ne contiennent pas d'idempotents: ils sont donc constitués par des éléments d'ordre infini puisque Φ contient avec a toutes ses puissances et puisque si a est d'ordre fini une de ses puissances est un idempotent.

2° Ceux $F_\lambda, \lambda \in \Lambda$ qui contiennent un idempotent $e_\lambda \in \Lambda$ et qui peuvent être définis par $F_\lambda = \{x; x \in D; \exists n \text{ entier positif: } x^n = e_\lambda\}$.

On a:

$$D = \Phi \cup F, \Phi \cap F = \emptyset$$

avec

$$\begin{aligned} \Phi &= \cup \Phi_\nu, \nu \in I && \text{ensemble des éléments d'ordre infini de D} \\ F &= \cup F_\lambda, \lambda \in \Lambda && \text{partie avec torsion T de D.} \end{aligned}$$

On sait qu'à tout idempotent e_λ de D est associé un groupe G_λ , sous-groupe de D maximum ayant e_λ pour élément neutre, deux groupes $G_\lambda, G_{\lambda'}$, $\lambda \neq \lambda'$ ayant une intersection vide - de sorte que D admet la partition classique:

$$(P) \quad D = \Sigma R_\lambda + R \text{ où } R_\lambda \text{ est le radical du groupe } G_\lambda : \\ R_\lambda = \{x, x \in D \ ; \ \exists p, x^p \in G_\lambda\}$$

et R est, ou la partie vide, ou une partie infinie dont tout élément est d'ordre infini.

Dans chaque R_λ il faut distinguer la partie avec torsion T_λ et l'ensemble des éléments d'ordre infini I_λ .

Si T_λ n'est pas vide, c'est évidemment le fuseau F_λ .

Si I_λ n'est pas vide et si $d \in I_\lambda$ appartient au fuseau Φ_λ , quelque soit $d' \in \Phi_\gamma$ on a: $d^m = d'^{m'}$ pour certains m et m' entiers positifs et comme il existe l'entier positif p tel que $d^p \in G_\lambda$ on a

$$(d')^{m'p} \in G_\lambda \text{ c'est-à-dire } d' \in I_\lambda .$$

Donc:

L'équivalence en fuseaux est plus fine que l'équivalence de partition (P). Nous appellerons *f-demi-groupe* un demi-groupe qui possède un seul fuseau.

Rappelons que si a et b appartiennent à un même groupe G_λ et si, pour la relation d'ordre dans D , $a < b$ cela entraîne strictement pour tout n $a^n < b^n$, relation impossible si a et b sont d'ordre fini. Donc

PROPOSITION 6. - *Dans un O-demi-groupe, chaque groupe G_λ est sans torsion et le fuseau F_λ est défini par*

$$F_\lambda = \{x; x \in D; \exists n \text{ entier positif, } x^n = x^{n+p} \text{ pour tout entier } p \text{ positif}$$

$$x^i \neq x^j, i \neq j, i, j \in \{1, 2, \dots, n-1, n\}$$

n est l'ordre de x , l'idempotent est un zéro de son fuseau. Si D est unitaire $F_u = \{u\}$.

Si a_λ et $a_{\lambda'}$, sont des éléments de D d'ordre fini appartenant à des fuseaux différents une relation d'ordre $a_\lambda < a_{\lambda'}$ entraîne, pour tout n , $a_\lambda^n \leq a_{\lambda'}^n$, donc $e_\lambda < e_{\lambda'}$, et on a:

PROPOSITION 7. - *Si D est un demi-groupe totalement ordonné et si $e_\lambda < e_{\lambda'}$ tout élément du fuseau F_λ est inférieur à tout élément du fuseau $F_{\lambda'}$.*

PROPOSITION 8. - *Si dans un demi-groupe ordonné D des éléments a et b d'un même fuseau sont tels que ab et ba sont comparables, ab et ba appartiennent à ce même fuseau.*

On sait en effet, qu'il existe les entiers positifs m et n tels que $a^m = b^n$.

Le lemme, si $ab \leq ba$ par exemple, nous donne:

$$a^m b^m = b^{n+m} \leq (ab)^m \leq (ba)^m \leq b^m a^m = b^{m+n}.$$

On a donc

THÉORÈME 2. - *Dans un O-demi-groupe les fuseaux sont stables.*

Considérons d'abord le cas particulier d'un O-demi-groupe dont la bande des idempotents est commutative.

THÉORÈME 3. — Dans un O-demi-groupe D dont les idempotents commutent la partie avec torsion T est un O-demi-groupe dans lequel l'équivalence en fuseaux est compatible.

d'où le

COROLLAIRE. — Un O-demi-groupe avec torsion T dont les idempotents commutent admet une image O-homomorphe $T^* \simeq T|_{(F)}$ qui est une O-bande commutative.

Soient en effet t_1 et t_2 deux éléments de D d'ordre fini. Pour un ordre total de D on a par exemple $t_1 t_2 \leq t_2 t_1$. Pour N assez grand

$$t_1^N = e_1, t_2^N = e_2 \quad \text{et le lemme donne:}$$

$$e_1 e_2 \leq (t_1 t_2)^N \leq (t_2 t_1)^N \leq e_2 e_1$$

Si $e_1 e_2 = e_2 e_1$, on a: $(t_1 t_2)^N = (t_2 t_1)^N = e_1 e_2$ qui montre d'abord que $t_1 t_2$ et $t_2 t_1$ sont d'ordre fini, et aussi que

$$F_1 F_2 = F_2 F_1 \subseteq \text{Fuseau de } e_1 e_2.$$

Revenons au cas général, nous allons étudier quelques propriétés des fuseaux F_λ c'est-à-dire d'un O-demi-groupe F_z avec torsion et zéro z comme idempotent.

A chaque ordre total sur F_z correspond la décomposition $F_z = N_f \cup P_f$ où N_f et P_f sont respectivement l'ensemble des éléments f-négatifs et f-positifs de F_z . On sait que

$$N_f^2 \subseteq N_f, \quad P_f^2 \subseteq P_f, \quad N_f \cap P_f = \{z\}$$

On a ici: $p < p^2 \leq z, n > n^2 \geq z$ pour tout $p \in P_f - \{z\} = P^*$

et tout $n \in N_f - \{z\} = N^*$.

On a donc $N_f P_f = \{z\}$.

Un exemple d'un tel O-demi-groupe est donné par le demi-groupe (F) ci-dessous:

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>z</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>
<i>b</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>
<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>
<i>c</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>d</i>	<i>z</i>
<i>d</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>z</i>

$$\begin{array}{c}
 \circ c \\
 \uparrow \\
 \circ c^2 = d \\
 \uparrow \\
 \circ z = a^3 = c^3 \\
 \uparrow \\
 \circ a^2 = b \\
 \uparrow \\
 \circ a
 \end{array}$$

Au contraire un demi-groupe F_z ne peut surement pas être totalement ordonné s'il contient trois éléments a_1, a_2, a_3 tels que a_1^2, a_2^2, a_3^2 soient distincts et différents de z et que trois des produits $a_i a_j, i \neq j, i = 1, 2, 3$ soient égaux à z; en effet, deux éléments a_1 et a_2 tels que $a_1^2 \neq a_2^2 \neq z, a_1 a_2 = z$ (ou $a_2 a_1 = z$) ne peuvent appartenir tous les deux à N_f ou à P_f .

PROPOSITION 9. - Si le fuseau F_z est totalement ordonné, P_f est un O-f-demi-groupe positivement ordonné et archimédien.

Soient en effet a et b deux éléments de P_f , et n et q les ordres de a et b , plus petits entiers tels que $a^n = z$ $b^q = z$.

$q < n$ entraîne $a \leq b$. En effet $b < a$ entraîne $b^q \leq a^q \leq z$, donc $a^q = z$ c'est-à-dire $n \leq q$.

Nous pouvons donc avoir $a < b$ si $q \leq n$ et dans la partition de P_f en éléments de même ordre tout élément d'une classe est inférieur à tout élément d'une classe correspondant à un ordre plus petit. La chaîne

$$a < a^2 < a^3 < \dots < a^{n-1} < a^n = z$$

est décomposée en classes par cette partition et b se place dans la classe de son ordre entre a^s et a^{s+1} , univoquement déterminés si ordre $a^s <$ ordre $b <$ ordre a^{s+1} , mais qui n'est pas univoquement déterminé en général si la chaîne $a < a^2 \dots < a^n \leq z$ a une intersection non vide avec la classe de P_f constituée par les éléments de P_f de même ordre que b .

Quoiqu'il en soit, d'une manière unique pour un ordre total s'il en existe un sur P_f , on a s univoquement déterminé tel que

$$a^s < b \leq a^{s+1}$$

et il en résulte

$$a^{s+1} \leq ab \leq a^{s+2},$$

d'où:

$$a \leq ab$$

$$b \leq ab,$$

et P_f est bien archimédien puisque si $a < b$, il existe n tel que $b \leq a^n$.

On verrait naturellement de même que N_f , est aussi, pour l'ordre opposé, positivement ordonné et archimédien.

L'exemple de O-f-demi-groupe P_f :

	a	b	ab	ba	z	
a	ab	ab	z	z	z	○ z
b	ba	z	z	z	z	↑ ○ ba
ab	z	z	z	z	z	↑ ○ ab
ba	z	z	z	z	z	↑ ○ b
z	z	z	z	z	z	↑ ○ a

montre que P_f n'est, en général, ni commutatif ni ordonné d'une manière naturelle.

Considérons maintenant les fuseaux sans idempotents Φ_v .

THÉORÈME 4. - Tout fuseau Φ sans idempotent d'un O-demi-groupe admet une image homomorphe qui est une partie positive stable du groupe additif des rationnels.

Dans le fuseau Φ considérons un élément fixe b . Soit a un élément quelconque de Φ et m et n des entiers positifs tels que $a^m = b^n$. Si on a aussi $a^{m'} = b^{n'}$, il en résulte $a^{mm'} = a^{m'n}$. Or tout élément de Φ étant d'ordre infini, ceci entraîne $mn' = m'n$ et à tout élément a du fuseau on associe le rationnel n/m . Soient alors a et a' deux éléments de Φ auxquels nous associons ainsi n/m et n'/m' . Supposons que pour un ordre total de Φ on ait par exemple $aa' \leq a'a$; le lemme nous donne:

$$a^{mm'} a'^{mm'} \leq (aa')^{mm'} \leq (a'a)^{mm'} \leq a'^{mm'} a^{mm'}$$

Mais

$$a^{mm'} a'^{mm'} = b^{nm'} b^{n'm} = a'^{mm'} a^{mm'}$$

et on a

$$(aa')^{mm'} = (a'a)^{mm'} = b^{nm'+n'm}$$

qui montre que aa' et $a'a$ ont pour image $n/m + n'/m'$.

L'application est donc bien un homomorphisme de Φ dans le cône positif du groupe additif des rationnels.

On a de plus:

PROPOSITION 10. — *Tout fuseau Φ totalement ordonné contenant un élément f -positif c est positivement ordonné et archimédien.*

D'abord tout élément a est faiblement positif car $a^s = c^t$, $c^2 > c$, $a^2 < a$ entraînent, les éléments étant d'ordre infini, $c^t < c^{2t}$, $a^{2s} < a^s$, $a^{2s} < c^{2t}$ en contradiction avec $a^{2s} = c^{2t}$.

Soient alors a et b deux éléments quelconques de Φ et supposons $a < b$, comme il existe les entiers positifs m et n tels que $a^m = b^n$ et puisque b est faiblement positif on a $b < a^m$ et b se place dans la chaîne des puissances de a :

$$(I) \quad a^s < b \leq a^{s+1}$$

d'où encore $a^{s+1} \leq ab \leq a^{s+2}$ et Φ est positivement ordonné et archimédien.

2. Considérons maintenant le cas particulier d'un O-demi-groupe vérifiant la condition:

$$(G) \quad a^p = a'^p \quad \text{entraîne} \quad a = a'.$$

Dans un tel demi-groupe, les fuseaux F_{e_v} contenant un idempotent se réduisent à cet idempotent et la partie avec torsion T est stable — c'est une bande. L'application de a sur m/n est alors injective car si a' s'applique aussi sur m/n , c'est que $a^m = a'^m$ donc que $a = a'$.

On a donc:

THÉORÈME 5. — *Si D est un O-demi-groupe vérifiant la condition:*

$$(G) \quad a^n = a'^n \quad \text{entraîne} \quad a = a'.$$

D est la réunion d'une bande et d'une partie Φ qui admet une partition en O-demi-groupes isomorphes à des parties stables positives du groupe additif des rationnels.

Nous appellerons demi-groupes rationnels de tels demi-groupes, ils sont donc en particulier abéliens.

La condition précédente est réalisée pour un O-groupe puisque $a < a'$ entraîne, l'isotonie y étant stricte,

$$a^n < a'^n$$

Dans ce cas T se réduit à $\{u\}$ et du Théorème 5 on déduit immédiatement [9] le résultat suivant:

THÉORÈME 6. - *Tout O-groupe admet une partition en parties stables $\Phi_{\nu,i}$, $\nu \in I$ $i \in \{1, 2\}$ et $\{u\}$ telle que les parties $\Phi_{\nu,1} \cup \Phi_{\nu,2} \cup \{u\}$ pour tout $\nu \in I$ sont des groupes rationnels.*

3. Pour terminer nous ferons les remarques suivantes:

1) D'abord la structure algébrique donnée par le théorème 5 pour un demi-groupe D vérifiant la condition G et pouvant être totalement ordonné serait encore vraie si on savait que D peut être muni d'un ordre tel que l'on puisse en déduire encore que les fuseaux sont stables, totalement ordonnés et que la condition G est satisfaite. Il en est ainsi, par exemple, pour les demi-groupes D, considérés par A. Bigard [10], qui admettent un ordre tel que:

1° D est positivement ordonné

2° $(\exists n, a^n \leq b^n) \Rightarrow a \leq b$

3° D n'a pas de paire anormale [1].

2) Nous remarquerons enfin que nous ne savons rien sur la façon dont se multiplient deux éléments n'appartenant pas à un même fuseau.

Nous ne savons pas non plus si, lorsqu'un élément d'un fuseau Φ_{ν} est plus petit qu'un élément d'un fuseau $\Phi_{\nu'}$, tout élément de Φ_{ν} est plus petit que tout élément de $\Phi_{\nu'}$. Néanmoins: Si $n \in \Phi_{\nu}$ est f -négatif, si $p \in \Phi_{\nu'}$ est f -positif et si $n < p$, tout élément $n' \in \Phi_{\nu}$ est plus petit que tout élément $p' \in \Phi_{\nu'}$.

En effet, de $n'^s = n^t$, $p'^m = p^q$, pour des entiers positifs convenables, résulte $n'^{sq} < p'^{tm}$ et, puisque tout élément de Φ_{ν} est f -négatif et tout élément de $\Phi_{\nu'}$ est f -positif, pour tout $N \geq sq$ et $M \geq tm$ on a $n'^N < p'^M$.

Prenons en particulier $M = N$ il vient $n'^N < p'^N$ qui entraîne bien $n' < p'$.

3) A partir de demi-groupes D_{ν} , $\nu \in I$ disjoints, on sait que l'on peut construire leur « somme ordinale » D, [1], en prenant la réunion ensembliste

$$D = \bigcup_{\nu \in I} D_{\nu}$$

ordonnant totalement I et définissant la multiplication dans D de la manière suivante:

x_{λ} désignant un élément de D_{λ} nous posons:

$$a_{\lambda} b_{\lambda'} = b_{\lambda'} a_{\lambda} = b_{\lambda'} \quad \text{si } \lambda < \lambda'$$

$$a_{\lambda} b_{\lambda} \quad \text{dans } D = a_{\lambda} b_{\lambda} \quad \text{dans } D_{\lambda}.$$

D est bien un demi-groupe.

D est ordonné par:

$$\begin{aligned} a_{\lambda'} < b_{\lambda} & \text{ si } \lambda = \lambda' \text{ et si dans } D_{\lambda} : a_{\lambda} < b_{\lambda} . \\ a_{\lambda'} \parallel b_{\lambda} , & \text{ si } \lambda \neq \lambda' . \end{aligned}$$

Si les D_{λ} sont ordonnés d'une manière naturelle la condition (α) permet d'ordonner D totalement, et D est alors ordonné d'une manière naturelle (Clifford [11]). Lorsqu'il n'en est pas ainsi il faut remarquer que l'ordre total, extension de l'ordre considéré, obtenu en posant $a_{\lambda} < b_{\lambda'}$ si $\lambda < \lambda'$ ne fait pas en général de D un demi-groupe totalement ordonné. En effet pour que D soit un demi-groupe ordonné il faut que l'isotonie soit vérifiée.

Or prenons $x_{\lambda'} \in D_{\lambda'}$. On doit avoir

$$\begin{aligned} a_{\lambda} x_{\lambda'} &= x_{\lambda'} \leq b_{\lambda'} x_{\lambda'} \\ x_{\lambda'} a_{\lambda} &= x_{\lambda'} \leq x_{\lambda'} b_{\lambda'} , \end{aligned}$$

et ceci n'est vrai que si $D_{\lambda'}$ est positivement ordonné (cf. [1] p. 173 et [10] p. 4).

On a donc sans peine:

PROPOSITION 11. — *La somme ordinale des demi-groupes totalement ordonnés D_{ν} : $D = \bigcup_{\nu \in I} D_{\nu}$ admet un ordre total extension de ces ordres totaux si et seulement si tous les D_{ν} , sauf éventuellement le premier s'il existe, sont positivement ordonnés.*

On a aussi que:

La somme ordinale D de groupes G_{λ} totalement ordonnés ne peut être ordonnée totalement de manière que l'application de D sur Λ donnée par $g_{\lambda} \rightarrow \lambda$ soit isotone, s'il y a plus d'un groupe G_{λ} qui n'est pas réduit à $\{e_{\lambda}\}$.

On peut encore remarquer que l'on peut toujours trouver un O-demi-groupe D ayant pour fuseaux des O-fuseaux donnés du type Φ_{ν} , et aussi des O-fuseaux du type F_{λ} , mais à condition que tous, sauf un au plus, se réduisent à leur partie P_f ou N_f .

BIBLIOGRAPHIE.

- [1] L. FUCHS, *Partially ordered algebraic systems*, Pergamon Press 1963.
- [2] A. H. CLIFFORD and G. B. PRESTON, *The algebraic Theory of semigroups*, I. «Math. Surveys», VII (1962).
- [3] T. SAÏTO, *Ordered idempotent semigroups*, «J. Math. Soc. Japan», 16 (1962).
- [4] T. SAÏTO, *Regular elements in an ordered semigroup*, «Pacific J. Math.», 13 (1963).
- [5] T. SAÏTO, *Ordered completely regular semigroups*, «Pacific J. Math.», 14 (1964).
- [6] T. SAÏTO, *Proper ordered inverse semigroups*, «Pacific J. Math.», 15 (1965).
- [7] H. LUGOWSKI, *Über Gewisse Halbmodul mit negativen Elementen*, Publ. Math. Debrecen, 1964.
- [8] O. NAKADA, *Partially ordered abelian semigroups*, II «Jour. Fac. Sci. Hokkaido», 12 (1952).
- [9] M. L. DUBREIL-JACOTIN, *Quelques propriétés des groupes ordonnés liées à la considération des fuseaux*, «C.R. Ac. Sc.», t. 262, 989-992 (1966).
- [10] A. BIGARD, *Décomposition des demi-groupes ordonnés*, Séminaire Dubreil-Pisot, 1964-65, n° 14.
- [11] A. H. CLIFFORD, *Naturally totally ordered commutative semigroups*, «Amer. J. of Math.», vol. LXXVI, No. 3, July, 1954, pp. 631-646.